



LEITFADEN VERHALTEN NACH KREUZBANDRISS-OP BEI DER KATZE

Die Pflege Ihres Tieres ist nun wieder in Ihren Händen. Beachten Sie bitte folgende Anweisungen, um eine bestmögliche Genesung zu gewährleisten.

Sollte ihr Tier noch einen gelben Druckverband an der Pfote haben, entfernen Sie diesen bitte umgehend (!) sobald Sie zuhause sind.

Erholungsphase:

Es ist möglich, dass Ihre Katze am Tag des Eingriffs noch etwas unkoordiniert ist. Geben Sie ihm/ ihr Zeit, sich an einem warmen und ruhigen Ort auszuruhen.

Das Allgemeinbefinden sollte sich von Tag zu Tag bessern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich der Zustand Ihres Tieres verschlechtert, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns oder Ihrem Haustierarzt in Verbindung.

Appetit, Harn- & Kotabsatz

Ihr Tier darf ca. eine Stunde nach der Narkose wieder etwas trinken. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht zu viel auf einmal zu sich nimmt, da dadurch so kurz nach einer Narkose, Erbrechen ausgelöst werden kann. Am Abend nach dem Eingriff darf es wieder Nahrung in mehreren, kleinen Portionen, zu sich nehmen.

Fehlender Appetit und Durst werden in den ersten 24 Stunden nach einer Operation häufiger beobachtet. Melden Sie sich bei uns, wenn Ihr Tier auch nach dieser Zeit noch nicht frisst und trinkt.

Erbrechen kann als Nebenwirkung der Narkose kurzzeitig auftreten. Bei intensivem Erbrechen oder Erbrechen bis am Folgetag, sollten Sie mit uns oder Ihrem Haustierarzt Kontakt aufnehmen.

Urin sollte Ihr Tier schon am Tag des Eingriffs absetzen können. Vor allem da es während der Narkose & Aufwachphase Infusionen bekommt. Spätestens 12h nachdem Sie Ihre Katze abgeholt haben sollte es wieder Urin absetzen. Ist das nicht der Fall, melden Sie sich bitte umgehend bei uns oder Ihrem Haustierarzt.

Kotabsatz wird dagegen häufig erst ein bis zwei Tage nach dem Eingriff beobachtet. Dies ist absolut normal.

Nachuntersuchung

Bitte stellen sie Ihre Katze in ca. Tagen bei uns oder Ihrem Haustierarzt zur Wundkontrolle vor. Um ein Belegen und damit eine Infektion zu vermeiden, muss der Halskragen bis zum Fäden ziehen in 10 Tagen, getragen werden. Kontrollieren Sie die Wunde bitte täglich. Krusten, Schmutz und getrocknetes Blut entfernen Sie bitte vorsichtig mit einem sauberen, angefeuchteten Einwegtuch. Sollten Sie eine deutliche Wundschwellung, ungewöhnliche Sekretion oder plötzlich vermehrtes Schonen der operierten Gliedmaße beobachten, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit Ihrem Haustierarzt oder mit uns in Verbindung.

Management in den nächsten Wochen zu Hause

Ein langfristig gutes Operationsergebnis ist wesentlich von Ihrer Mithilfe in den nächsten Wochen abhängig. Eine zu frühe Belastung des Gelenkes schadet. Um eine optimale Heilung zu gewährleisten, muss Ihre Katze für die nächsten 14 Tage ruhig gehalten werden. Wir empfehlen die Unterbringung in einem kleinen Raum (ohne die Möglichkeit irgendwo hochspringen zu können) oder einem Laufstall/Käfig. Nach diesem Zeitraum darf sich Ihre Katze für ca. 4 Wochen in der geschlossenen Wohnung frei bewegen. Ob sie nach dieser Zeit wieder raus darf, entscheidet der behandelnde Tierarzt.

Die Betreuung durch einen Tierphysiotherapeuten wird unbedingt angeraten. Dabei entscheidet der Tierarzt ab wann mit aktiver Krankengymnastik begonnen werden darf.

Wenn Sie nicht wissen an wen Sie sich diesbezüglich wenden sollen, helfen wir Ihnen gerne weiter!

Medikamente

Ihre Katze benötigt noch Medikamente. Diese verabreichen Sie bitte wie von uns verschrieben.

Bitte melden Sie sich bei Unsicherheiten lieber einmal zu früh als zu spät.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, und Ihrem Tier eine schnelle Genesung.