



## LEITFADEN NACH KASTRATION EINES MÄNNLICHEN KANINCHENS

Die Pflege Ihres Tieres ist nun wieder in Ihren Händen. Beachten Sie bitte folgende Anweisungen, um eine bestmögliche Genesung zu gewährleisten.

Sollte ihr Tier noch einen gelben Druckverband an der Pfote oder am Ohr haben, entfernen Sie diesen bitte umgehend (!) sobald Sie zuhause sind.

### Erholungsphase:

Es ist möglich, dass Ihr Rammler am Tag des Eingriffs noch etwas unkoordiniert ist. Da er durch die Narkose die Körperwärme noch nicht so gut regulieren kann, sollten Sie ihn eine Nacht in der Wohnung/ an einem warmen Ort behalten. Um die Operationswunde zu schützen und Verunreinigung zu vermeiden, verzichten Sie dabei bitte auf Stroh und Einstreu und legen Sie stattdessen Handtücher unter.

Das Allgemeinbefinden sollte sich von Tag zu Tag bessern. Ist die erste Nacht gut überstanden & Ihr Kaninchen macht einen fitten Eindruck, frisst, trinkt & hat Kot & Urin abgesetzt, dürfen Sie es wieder zu den anderen Kaninchen setzen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich der Zustand Ihres Tieres verschlechtert, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.

Die Zeugungsfähigkeit bleibt bei einem Rammler, der erst nach Eintritt der Geschlechtsreife kastriert wurde, bis zu 6 Wochen erhalten! Ist Ihr Kaninchen 3 Monate oder älter, sollten Sie ihn die kommenden 6 Wochen von weiblichen Kaninchen fern halten um unerwünschten Nachwuchs zu vermeiden.

### Appetit, Harn- & Kotabsatz

Da Kaninchen keine Muskulatur im Magen besitzen und die Verdauung nur funktioniert, wenn das Tier dauerhaft frisst, sollte Ihr Kaninchen, zuhause angekommen, direkt wieder Nahrung zu sich nehmen.

Fehlender Appetit und Durst können schnell lebensbedrohliche Folgen haben. Frisst es kaum oder gar nicht sollten Sie keine Zeit verlieren und umgehend mit uns Kontakt aufnehmen. Bereits 4 Stunden ohne Nahrungsaufnahme sind beim Kaninchen kritisch. Bieten Sie gerne besondere Leckerbissen an, um es zum Fressen zu animieren. Kaninchen sind sehr schmerzempfindliche Tiere und stellen das Fressen aufgrund von Schmerz schneller als andere Tiere ein. Deshalb bitten wir Sie das Fressverhalten Ihres Kaninchens gut im Auge zu behalten.

Urin & Kot sollte Ihr Kaninchen daher auch schon am Tag des Eingriffs absetzen können. Sind kleine, wie vertrocknete Rosinen aussehende, Köttelchen zu finden, handelt es sich um den sogenannten „Hungerkot“, ein Zeichen, dass Ihr Kaninchen zu wenig Futter zu sich nimmt. In diesem Fall sollten Sie es gut beobachten und zusätzliches Futter anbieten. Stellt sich der Kotabsatz bzw. das Fressverhalten ganz ein, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

### Operationswunde/Nachsorge

Achten Sie darauf, dass Ihr Tier die Wunde unter keinen (!) Umständen beleckt und sie sauber bleibt. In der Regel stören sich die Rammler nicht an der kleinen Wunde. Knabbert er dennoch daran, bitten wir Sie einen Halskragen bei uns abzuholen, um die Wunde zu schützen. Der Halskragen sollte, im Falle er wird benötigt, 5 bis 10 Tage durchgehend getragen werden. Bei Unsicherheit oder Auffälligkeiten bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen. Dies kann beispielsweise eine plötzliche und vorher nicht da gewesene, deutliche Schwellung, ungewöhnliche Sekretion (Blut, Wundflüssigkeit, Eiter) oder Öffnung der Wunde sein.

Eine Nachuntersuchung sollte 10 Tage später vom Tierarzt durchgeführt werden. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Bis dahin kontrollieren Sie bitte täglich die Wunde.

Fliegenmaden sind bei Wunden von Kaninchen ein zusätzliches Risiko. Vor allem feuchte, verschmutzte oder verletzte Stellen auf Körper und Haut des Kaninchens sowie ungereinigte Ställe & Gehege ziehen Fliegen an. Bitte achten Sie nach der OP deshalb ganz besonders darauf den Stall sauber zu halten.

Medikamente gegen Schmerzen wurden bereits von uns verabreicht.

Bitte melden Sie sich bei Unsicherheiten lieber einmal zu früh als zu spät!

Wir wünschen Ihnen alles Gute, und Ihrem Tier eine schnelle Genesung.