



LEITFADEN VERHALTEN NACH OPERATIVER FRAKTURVERSORGUNG

Die Pflege Ihres Tieres ist nun wieder in Ihren Händen. Beachten Sie bitte folgende Anweisungen, um eine bestmögliche Genesung zu gewährleisten.

Sollte ihr Tier noch einen gelben Druckverband an der Pfote haben, entfernen Sie diesen bitte umgehend (!) sobald Sie zuhause sind.

Erholungsphase:

Es ist möglich, dass Ihr Tier am Tag des Eingriffs noch etwas unkoordiniert ist. Geben Sie ihm/ ihr Zeit, sich an einem warmen und ruhigen Ort auszuruhen.

Das Allgemeinbefinden sollte sich von Tag zu Tag bessern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich der Zustand Ihres Tieres verschlechtert, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns oder Ihrem Haustierarzt in Verbindung.

Appetit, Harn- & Kotabsatz

Ihr Tier darf ca. eine Stunde nach der Narkose wieder etwas trinken. Achten Sie jedoch darauf, dass es nicht zu viel auf einmal zu sich nimmt, da dadurch so kurz nach einer Narkose, Erbrechen ausgelöst werden kann. 4-5h nach dem Eingriff darf es wieder Nahrung in mehreren, kleinen Portionen, zu sich nehmen.

Fehlender Appetit und Durst werden in den ersten 24 Stunden nach einer Operation häufiger beobachtet. Melden Sie sich bei uns, wenn Ihr Tier auch nach dieser Zeit noch nicht frisst und trinkt.

Erbrechen kann als Nebenwirkung der Narkose kurzzeitig auftreten. Bei intensivem Erbrechen oder Erbrechen bis am Folgetag, sollten Sie mit uns oder Ihrem Haustierarzt Kontakt aufnehmen.

Urin sollte Ihr Tier schon am Tag des Eingriffs absetzen können. Vor allem da es während der Narkose & Aufwachphase Infusionen bekommt.

Kotabsatz wird dagegen häufig erst ein bis zwei Tage nach dem Eingriff beobachtet. Dies ist absolut normal.

Nachuntersuchung

Bitte stellen sie Ihr Tier in Tagen bei uns oder Ihrem Haustierarzt zur Wundkontrolle vor. Sollte zur zusätzlichen Stabilisierung und zum Schutz der OP-Wunde ein Verband angebracht worden sein, sollte dieser vom Haustierarzt oder uns regelmäßig gewechselt werden. Die Heilung von Knochengewebe nimmt in der Regel 2 bis 3 Monate in Anspruch. Das erste Röntgen nach 3 bis 4 Wochen hilft bei der Einschätzung des Heilungsprozesses und somit, bei der Entscheidung wie sehr das Tier in seiner Bewegung weiterhin eingeschränkt werden muss.

Operationswunde/Nachsorge

Achten Sie darauf, dass Ihr Tier die Wunde unter keinen (!) Umständen beleckt und sie sauber bleibt.

Der Halskragen/Body muss für mindestens 10 Tage getragen werden. In der Regel können die Fäden nach eben diesen 10 Tagen gezogen werden. So lange kontrollieren Sie die Wunde bitte täglich. Bei Unsicherheit oder Auffälligkeiten bitten Wir Sie sich mit uns oder ihrem Haustierarzt in Verbindung zu setzen. Dies kann beispielsweise eine plötzliche und vorher nicht da gewesene Schonhaltung bzw. Lahmheit, eine deutliche Schwellung, ungewöhnliche Sekretion (Blut, Wundflüssigkeit, Eiter) oder Öffnung der Wunde sein.

Management in den nächsten Wochen zu Hause

Ein langfristig gutes Operationsergebnis hängt auch von Ihrer Mithilfe in den nächsten Wochen ab. Eine zu frühe, zu starke Belastung kann Schaden anrichten! Die Bewegungseinschränkung ist über einen Zeitraum von mindestens 8 Wochen unbedingt erforderlich. Wir empfehlen je nach Art & Größe des Tieres und Art der Fraktur die Unterbringung in einem kleinen Raum, einem Laufstall, Käfig oder einer ähnlichen Einrichtung. Sprünge (Treppen, Auto, Möbel etc.) sind unbedingt zu vermeiden. Hunde sind unterdessen beim Spazieren die gesamten ersten 8 Wochen an der Leine zu halten. Wann Sie Ihr Tier wieder freilaufen



lassen können, entscheidet der weitere Heilungsverlauf/ das Kontrollröntgen und damit der behandelnde Tierarzt.

Des Weiteren empfiehlt sich die Betreuung durch eine/n Tierphysiotherapeuten/in.

Der Tierarzt entscheidet dabei, ab wann mit aktiver Krankengymnastik begonnen werden darf.

Wenn Sie nicht wissen an wen Sie sich diesbezüglich wenden sollen, helfen wir Ihnen gerne weiter!

Bewegungsplan für Hunde(an der Leine!):

Tag der OP: so wenig wie möglich und nur um sich zu lösen.

Tag 1 bis zum Fäden ziehen (i.d.R. Tag 10):

- so wenig wie möglich und nur um sich zu lösen.
- 1-3x 5min an der Leine

Tag 10 bis zum Kontrollröntgen:

- 3x 5min an der Leine
- 3x 15min an der Leine

Nach dem Kontrollröntgen entscheidet der Tierarzt die weitere Bewegungstherapie

Medikamente

Ihr Tier benötigt weiterhin Medikamente. Diese verabreichen Sie bitte wie von uns verschrieben.

Bitte melden Sie sich bei Unsicherheiten lieber einmal zu früh als zu spät.

Wir wünschen Ihnen alles Gute, und Ihrem Tier eine schnelle Genesung.